In Memory of
Dr. and Mrs.
Alexander
Duval d'Adrian

Missouri Botanical Garden
Library

Mesospinidium vulcanicum Rchb. f.

Ost Peru . (Tungnaragua)

Blätter 3–5 Zoll lang
Blattstengel ½ – 1 Fuss lang
8–10 Rippen – Kelch

Schomburgkia Lyonsii, Lindley.

Jamaica.

Dendrobium Findleyanum Reich.f.
(Burma).

Cattleya Schilleriana var concolor. Reichb. f.

Brasilien. –

Colax jugosus, Lindl.

Brasilien . -

Cattleya Schilleriana Reichb f. (Brasilien). -

C. concolor var.

Cereianthus sine nr. aculis purpureis

Pescatorea Dayana var rhodacra Reichbf.

Nen-Granada

Blütheneit Juni.

Pescatorea Wallisi Lind.

Central America.

Selenipedium reticulatum; Reichb. f. –

Ecuador

Bords du rio Zamora

Im Veget. zeit mittlere Feuchtigkeit. - Nähe erforderlich Licht & viel Luft. -

Dendrobium nudatum Reichb. f.



Stationers Hall Court, E.C.

Laelia elegans . Morren.

Brasilien, St: Catharina

5 - 7 Blumen

Syn. Cattleya elegans. -

Knollen 1 - 1½ fuss lang

1 - 2 Blatt.

Calanthe Dominii . Hort.

Hybride zwischen Cal. furcata ♀ C. Mascula.

Im zweiten Jahre nach der Aussaat
war der Sämling in Blüthe.

Die einzelne Blume ist Calandrya mascula Lindl.

Galeandra nivalis. Hort.

Odontoglossum cordatum Lindl.

Entdeckt: 1838 von Barker in Mexico, und von Hartweg in Guatemala, wurde sie wieder eingeführt von Funk & Schlim aus Neu granada, in einer Höhe v. 2300 Metre

Blumenähre bis 1 m Höhe.

Cultur: Kalt und sehr leicht.

Pescatorea Lehmannii Reich. f.—

Anden v. Ecuador .. Lehmann

Cypr: Fairieanum. Lindl:

– Aus Assam. –

Cattleya Percivaliana var: Reichenbachi.

Cattl. labiata Lindl

Percivalliana var nov. Reichb
etwas blasser als die var.
Reichenbachi.

Wächst auf felsen der Sonne
& dem Winde ausgesetzt. 2000 m hoch.
Daher Luft Licht & Wärme

Cattleya virginalis Lind. & André.

Communications. — From the Editors.

Of Memoirs. —

Cypripedium grande Reichf.

~Bastard: candatum ♂ + Roezlii ♀

Blätter schwertförmig 60 – 80 Cm lang.
Blumenschaft 75 Cm hoch, viele Blumen, diese
15 Cm Durchmesser

von Veden bei J. Veitch gezogen.
100 Mark. –

Garten Zeitung Wilmak
No 42 en 1884. Seite 498

Cal. angustifolia Wight.

Ceylon (King-Nuwara Eliya)
Madras (Nilghiri Ghirge)

Blüht von (May – October.
Auf Felsen und Bäumen, selten im Tiefland
in Gebirgswäldern.

Nutzholz, Brennholz und Honig. –

Iyanvalli (Anamalli ?) Gebirge
bei Coimbatur, Dekkan.

Epiphyt, Stamm 1–1½ cm lang
Blätter cilyndrisch, 4–6" lang
blüht im Februar.

Dendrobium chrysotoxum, Lindl.

Ost Indien

Dendrocoryne

1 Sensiflorum

2 Aggregatum

3 tetragonum

4 Veitchianum

5 Speciosum

6 Chrysoboxum.

Dendrobium MacCarthiæ. Hooker.

Auf Ceylon in den Wäldern von Ratnapura
und Punta Galle, dort genannt "Wissak-mal"
Maiblume

Stämme 1½ - 2 Schuh lang
4-5 blümen. -
Hängender Wuchs. —
Schwer zu kultiviren

Spoatzoglonis Augustorum Reich: f:-

Sunda Inseln

Wächst bei Wasserfällen

Wuchs der Flagellaria
Große Knollen & lange
Blatter (wie Ich Rohr)

Topf, sonnige Haide erde
etwas Thon erde, Dünger
u viel Drainage. Schattig aber ohne
Wasser, feuchte Luft, viel Wasser
während der Vegetationszeit
Wenig Guss - In der Ruhezeit
fast trocken. -
Anno 986 die Pflanze
Pflanze in ein Buch 200 fo. -

Odontoglossum Roezlii Reichenb. F.

Nov-Granadav.

Von Roesl entdeckt.

Blühtzeit Jänner im Kalten Hause

(Cultur wie bei D. Vexillarium)

Thomas Benson R.I.

Aeacides mitratum .R.f.-

Moulmein.

Ausserordentlich selten.
Ein einziges Exemplar existirt
bei Day in Tottenham. —

Angraecum citratum. Perr. Th.

Madagascar

Dendrobium transparens. Wall.

Nepal

Stämme 8 – 10 Zoll lang

Trichocentrum tigrinum Lind & Reichenb.

Ecuador. 1800 M.M. höhe.

Temperirt.

Dendrobium Parishii Bateman.

stärme ich fass ein etwas mehr lang
hängender Typus — könnte leider
auch ihr Leiden Kretins fallen ab —
Gesicht sehr hübsch & rein.

Manheim

Chysis bractescens Lindley.

Mexico – Temperirt

Kühe im Winter mit sehr wenig

Wasser. —

Odont: maxillare, Linley.
— Mexiko —

Dendrobium marginatum Batem.

Monsieur ..

Stämme bleistift dicke . füsse u darüber
lang –

Pescatorea Klabochorum Reichb. F. Neu-Granada.

Entdeckt: Brüder Klaboch. –

Blüthezeit Sommer

Culturen: Bald wie bei Leontopodium

Cattleya bicolor, Lindl.

Brasilien.

(Bom Jesus de Bananal)

Stämme schlank, dünn
1 bis 1½ Schuh hoch. –

Lælia acuminata Lindl

Guatemala

(Flor de Jesus)

Catasetum tigrinum Reichl. f.

Parà.

Viel Wasser und Dung zur Vegetations
u vollkommen trocken zur Ruhezeit
blüht aus dem neuen Knollen.

Barkeria elegans, Knowles and Westcott.

Mexico

Stämme über Spaltung

Paolo Gino Brunello Fecit

Pleione humilis Don.

Pleione

Has oblong pseudo-Bulbs
Oval Leaves & the radical
Leaf [illegible] the Autumn

Wanna graduate, Chuck?

Central amerika

Eine Orchidee.

Blumen, mit lieblichem
Wohlgeruch, und
manchmal statt gelblich - weiss:
blass grünlich grau gelb. -

Dendrobium Kerexifolium. Brown.

Port Jackson. New South Wales.

Auf einem Holzstücke Kalk zu ziehen.
Blüht sehr reich im Dezember. –

Paphinia cristata v. Randi Lind.

Trinidad & Guiana

Warm.

Epidendrum Sophronitis Link & Reichb-f.

Losca in Bern, von Wallis und andern —

Blüht Mai u Juni —

Stanhopea ecornuta, Lemaire.

Central amerika.

Diese Species verbindet die Peristeriaceae mit den Stanhopeaceen.

Syn:

Stanhopeastrum acornectum. Reichb.

Gysis aurea var Lemminghei . L.

Ch. Lemminghei Linden Cat.

Central America.

Burlingtonion decorav vas: pictor. Lemnius.

Brasilien

Typus. Sepalis petalisque albis
roseo maculatis.
Pilosa. Sep. pet. purpureo
atro sanguineo pictis. –



Dendrobium Russelli . Blume.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Hans Bo Kr Koch

Ida Lo Otto Carlsen.

Odontoglossum madrense Reichb. f.

Sierra Madre in Mexico

Region semi-froide, peu d'humidité
pendant la saison de repos.
Eau en abondance pendant les mois de végétation
Corbeille. – Terre fibreuse et sphagnum en sus.

(Un fait digne de remarque, c'est la grande force de vitalité des Orchidées des régions tempérées des Andes d'Anahuac (Mexico) et de Guatemala, comparativement à celles qui habitent les mêmes altitudes au sud de l'Isthme de Panama. –)

Lange Scheinknollen, fast walzenförmig
im Herbste. –

Dendrobium amboinense. H: Rollison

Ombaima !

Die Knollen sonst 3-4 Zoll lang
werden bei blühbaren Zustande
der Pflanze über 1 ½ Schuh lang,
werfen das Blatt ab, formen
sich an der Basis birnenförmig
und bringen paarweise die
Blumen bei den vorherigen Laubtrieben..

Warmhaus:

Sunset Grove Academy

Limodis rosea (superba) Linn.

Monheim

Nach Ausbildung der Knolle u eingetretenen Blätterfall tritt die Ruhe ein – u muss die Pflanze ganz trocken gehalten werden. Die Pflanze blüht bei beginn der Vegetationsperiode – blüht sehr leicht. –

Herr Kempéréa. —



Dendrobium Falconeri, Hook. f.

Seit 1858 eingeführt aus den Bergen bei Boota (Indien)

Cultur. Zur Vegetations Zeit sehr feucht u warm
nach beendeter Vegetation Kühl und
fast ganz trocken. – wird die Pflanze
nach 3–4 Monaten wieder warm und
feucht gehalten so blüht sie. – Die
Tuberoid muss Anfang März Durch
vorstehenden Prozess beendet werden.

Coelogyne Schilleriana Reich. f. -

Montmein.

Laelia praestans Linl.

Brasilien

Laelia pumila et praestans ne reclament aucun soin exceptionnel
de culture et fleurissent chaque année. Serre chaude. —

Cattleya Trianæ var. Annæ Lind & Rchb. f.

Columbien

Bletia Sherrattiana Batem:

Neu-Granada

Erdorchidee, einfache Cultur
in weitem Topfe - Kühl
Vier gefaltete Blätter eine Elle
lang.
12 ü mehr blumen. -

Im Curtis Bot. Magaz. v. XXIII
ist diese Orth. entgegen der Beschreibung
violet gemalt. —



Trychocentrum Porphyrio Rchb. f.



Dendrobium cretaceum. Lindl.

Assam, Mergui, Khasya hills.

Entgegengesetzt jener Stelle
wo das Blatt aufsitzt, erscheint
die einzelne Blume an
jedem Internod.

Endemorobium, Lindl.
Grastidium, Blume.

Bolbophyllum Lobbii, Lindl.

Java

Warm, auf einem Holzstück
nahe dem Lichte gezogen, wächst
u. blüht selbes sehr leicht.

Cattleya Whitei Hort. Low.

Ein natürlicher Bastard, das Unicum, im Garten des H.^n Holbrook Gaskell Wollton Wood bei Liverpool wurde vom Reisenden, White, auf einem Baume, zwischen Cattl. labiata u. Catt. Schilleriana wachsend getroffen. —

Aus der Orig. Zeichnung (Regels Gartenflora Juli 84) ist nicht zu entnehmen ob die Blüthe aus der Knollenspitze entspringt. —

Cattleya Walkeriana Gard.

Syn. Cattleya bulbosa Lindl.

(blüht aus der Knollenbasis)

Brasilien

Warm!

Oncidium phymatochylum. L.

Mexiko.

Bulben 4–5 Zoll lang
1 Blatt 12–14 Zoll lang
u 3 Zoll breit.
Blüthenstängel samt
Blüthenrispe 2–2½ Fuss lang.

Bolbophyllum reticulatum Batem.

Borneo.

Blüth im August.

die schönste Art von Nelkenpfeffer

Warren discolor Smith

Part of Answer.

In Hasenclever & Kayser.

Galeandra Baueri : var. floribus luteis.

Franz: Guiana, Mexico New-Granada

Cattleya Lawrenceana . Rb. f.

Roraima Gebirge

Knollen Kurz u. dick. 4 blum

Aërides Japonicum.

Lind: et Reichenb. fil.

Syn. Occocladus falcata Reg.

Von den Inseln bei Japan genannt Oki.

Kalthaus. bei Wontiglossum.

Dendrobium cucumerinum. M'Leay.

Ost-Küste von Australien

Wächst an Bäumen, vollkommen
der Sonne exponirt, in einem Land-
striche wo lange Trockenheit
herrscht.
Es gedeiht am besten in einem
Kasten oder Glashaus, welches
künstlich nicht gewärmt wird,
es ist zur Winterzeit lediglich
vor frost zu schützen. –

Aganisia tricolor . Brown.

Amazonenstrom.

Blüthenstengel aus der Knollenbasis
aufsteigender Wuchs. 3-4 Blümen.
Werm?

Nahe der Aganisia (Acacallis)
cyanea, diese differirt in der
purpurbraunen Lippe.-

Nephelaphillum scapigerum. Hook.

Venus

Vanda Hookeriana Smith.

Exige la sua chiara [illegible] la vegetazione [illegible] la stessa
epoca [illegible]
florazione [illegible] in [illegible] a ripetersi la [illegible]
a [illegible], [illegible]
[illegible] nuova fioritura. —

[illegible]

Paphinia cristata, Lindl.

Trinidad & Neu Granada

Kühl im August im
warmen Hause.

Dendrobium Dalleriannum, Bateman.

N. gonorrhoeae heat

Cattleya guttata var: Leopardina

St. Catharinæ.

Pseudobulb. 0.40 a 0.60 m lange
Cultur im Topf in sehr lockerem
Compost.

Volles Sonnenlicht, sonst werden
die Knollen nicht reif u bleiben
dünn —

Viel Wasser zur Trieb-, u gar
Keins zur Ruhe-Zeit. —

Coelogyne Hookeriana Lindl.

Sikkim-Himalaya

Frühjahrsblüher Sp. M.

(Kleine Notizen)



Cattleya Malouana. Lind.

Patria latet.

C. speciosissima v. Malvana
bis 1886 Ein Exemplar in Europa vorhanden

Kurze dicke Knollen
Kurze Blätter.
2. Blumen.-